

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**  
**CONSULTE A SU MÉDICO**  
**IFENIL**  
**CLINDAMICINA (como clindamicina fosfato), 100 mg**  
**KETOCONAZOL, 400 mg**  
*Óvulos vaginales*

**Venta Bajo Receta**

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **IFENIL** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

***Fórmula***

Cada óvulo vaginal contiene:

Clindamicina (como Clindamicina Fosfato) 100,00 mg, Ketoconazol 400,00 mg.

Excipientes: Glicéridos Semisintéticos sólidos.

**¿Qué es IFENIL y para qué se usa?**

Es la asociación de un antibiótico bactericida, la clindamicina, y un antimicótico, el ketoconazol, para uso tópico intravaginal. Se lo utiliza para tratar vaginosis bacteriana originada por *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus spp* y otras bacterias anaerobias como *Bacteroides fragilis*, así como en vaginitis mixtas y candidiasis vaginal.

**Antes de usar IFENIL**

***No use IFENIL si***

- Si es alérgico a cualquiera de los componentes de la fórmula, que figuran detallados en el estuche.
- Si ha tenido previamente enfermedades inflamatorias intestinales como: enteritis regional (Enfermedad de Crohn), colitis ulcerosa o con antecedentes de colitis “asociada con antibióticos”.

***Tenga especial cuidado con IFENIL***

Puede producir irritación vaginal, prurito y picazón, especialmente al iniciar el tratamiento.

Además, puede aumentar el desarrollo de otros microorganismos no susceptibles.

**Información Importante:** debe evitar mantener relaciones sexuales vaginales, aún con protección. No se recomienda el uso de condones o los diafragmas vaginales por

lo menos después de 3 días de finalizado el tratamiento porque los componentes del producto pueden debilitar la goma o el látex.

No utilice tampones o duchas vaginales durante el tratamiento con este producto.

Durante el tratamiento puede observar alguna mancha en la ropa interior ya que algunos de los componentes del producto pueden no absorberse totalmente.

Avise a su médico si comienza a menstruar durante el tratamiento.

### ***Toma simultánea de otros medicamentos***

Consulte a su médico si está tomando por vía oral bloqueantes neuromusculares ya que la clindamicina puede potenciar su efecto.

### ***¿Cómo usar IFENIL?***

Preferentemente a la noche al acostarse, introducir un óvulo profundamente en la vagina. El óvulo de **IFENIL** se disuelve con la temperatura y humedad de la vagina. Este tratamiento lo debe continuar durante 7 días consecutivos. Consulte a su médico si durante el tratamiento olvida colocarse un óvulo.

### ***Embarazo***

Consulte con su médico si está o tiene sospechas de estar embarazada.

### ***Lactancia***

Este producto puede utilizarse si usted está amamantando.

### ***Uso en niños***

No usar en menores de 16 años de edad.

### ***A tener en cuenta mientras toma IFENIL***

#### ***Efectos indeseables (adversos)***

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Se han comunicado los siguientes efectos adversos:

#### ***Clindamicina***

- *Tracto genital*: Inflamación vaginal sintomática, infección por hongos (cándida albicans), irritación de la vulva, infección de la vagina por tricomonas.
- *Sistema nervioso*: aturdimiento, dolor de cabeza, vértigo.
- *Piel*: erupción, urticaria.

- *Tracto gastrointestinal:* acidez, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, dolor abdominal.

#### *Ketoconazol*

#### *Efectos adversos frecuentes*

- Sensación de quemazón en la vagina o en la zona alrededor de la entrada de la vagina.
- Irritación en el lugar de aplicación

#### *Efectos adversos de frecuencia no conocida*

- Picazón, erupción en la piel

#### **¿Cómo conservar IFENIL?**

- Conservar en lugar fresco y seco, entre 15 y 30° C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**

#### **Presentación**

Envases con 7 óvulos.

#### ***Si Ud. toma dosis mayores de IFENIL de las que debiera***

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.**

**No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar**

**la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

**<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a**

**ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

Certificado N°

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Elaborado en Coronel Mendez 438/440 - Wilde