

# PROSPECTO

---

## **ACTRON MUJER FORTE Rápida Acción ®**

### **IBUPROFENO 400 mg**

Cápsulas blandas de gelatina

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

#### **¿Qué contiene ACTRON MUJER FORTE Rápida Acción ®?**

Cada cápsula de gelatina blanda contiene: como ingrediente activo, 400 miligramos de Ibuprofeno; e ingredientes no activos hidróxido de potasio 43%, polietilenglicol 600, gelatina, anhidrisorb 85/70, nipagin, nipasol, verde FD&C N°3, amarillo de quinoleína.

#### **ACCIONES**

Analgésico (calma el dolor), Antifebril (baja la fiebre) y Antiinflamatorio (reduce la inflamación).

#### **¿Para qué se usa ACTRON MUJER FORTE Rápida Acción ®?**

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, musculares, articulares, de dientes, menstruales). También alivia los dolores asociados a estados gripales, resfrío común y para bajar la fiebre.

#### **¿Qué personas no pueden recibir ACTRON MUJER FORTE® Rápida Acción?**

No use **ACTRON MUJER FORTE® Rápida Acción** cápsulas de gelatina blanda en caso de:

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto (Si tiene antecedentes de asma o rinitis).
- Si ha padecido reacciones alérgicas severas luego de la ingesta de aspirina u otros antiinflamatorios.
- Tiene o ha tenido úlcera o hemorragia en el estómago, sangrado gastrointestinal o perforación.
- Enfermedades inflamatorias intestinales.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 12 años.
- Se encuentra cursando el tercer trimestre de embarazo.

#### **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar ACTRON MUJER FORTE® Rápida Acción?**

Actron Mujer Forte RA\_CCDS 04

Página 1 de 4

IF-2024-121223103-APN-DERM#ANMAT

Debe ser tomada la menor dosis por el periodo de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. El uso de ibuprofeno en altas dosis (particularmente en dosis de 2400 mg al día) puede estar asociado con un pequeño aumento del riesgo de eventos trombóticos arteriales.

Este producto no debe ser usado para dolores abdominales.

Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si:

- Es mayor de 65 años
- Tiene problemas circulatorios.
- Si tiene enfermedades del corazón, riñones o hígado.
- Si tiene antecedentes de hipertensión arterial.
- Debe tomar aspirina en bajas dosis para inhibir la agregación plaquetaria.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Tiene una infección. El ibuprofeno puede enmascarar los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que Actron Mujer Forte Rápida Acción® pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

**Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

### **¿Cómo se usa ACTRON MUJER FORTE® Rápida Acción?**

Vía de administración oral.

Adultos y mayores de 12 años:

1 cápsula blanda cada 6 u 8 horas. Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima diaria de 3 cápsulas blanda de 400 mg (1200 mg/ día). Para pacientes con sensibilidad estomacal, se recomienda tomar preferentemente después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 / 72 horas consulte a su médico. **No usar en niños menores de 12 años.**

### **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando ACTRON MUJER FORTE® Rápida Acción?**

Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:

- Experimenta alergias y reacciones en la piel, como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara. Se han informado signos de una reacción alérgica a este medicamento, incluidos problemas respiratorios, hinchazón de la cara y la región del cuello (angioedema), dolor en el pecho con

ibuprofeno. Deje de tomar Actron Mujer Forte Rápida Acción® y pónganse en contacto inmediatamente con su médico o con urgencias médicas si nota alguno de estos signos.

- Experimenta empeoramiento de asma.
- Experimenta toxicidad gastrointestinal, sangrado o ulceración.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal, dolor en el pecho, que puede ser un signo de una reacción alérgica potencialmente grave llamada síndrome de Kounis. Si ocurre esto o experimenta cualquier otra reacción, consulte a su médico y suspenda su uso.

#### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez TE: (011) 4962-6666 ó 4962-2247.
- Hospital A Posadas TE: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 25° C. No almacenar en heladera. Proteger de la luz solar directa.

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

#### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

#### ¿Tiene usted alguna pregunta?

Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Fabricado en Av. Márquez 691, Loma Hermosa, Pcia. de Buenos Aires y acondicionado en Calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, Pcia. de Buenos Aires; por **BAYER S.A.**, Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 39.723

Servicio de Información Médica: E-mail: [contactoCHconosur@bayer.com](mailto:contactoCHconosur@bayer.com)

Vencimiento:

Actron Mujer Forte RA\_CCDS 04

Página 3 de 4  
IF-2024-121223103-APN-DERM#ANMAT

Lote N°:

Fecha de última revisión:

Versión: CCDS 04.

Presentaciones: Envases por 8, 10, 12, 16 y 20 unidades.

Actron Mujer Forte RA\_CCDS 04

Página 4 de 4  
IF-2024-121223103-APN-DERM#ANMAT