

PROSPECTO PARA EL USUARIO

GASTROTEM

OMEPRAZOL

Cápsulas

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO.

Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE GASTROTEM?

Cada cápsula contiene:

	<u>Dosis:</u>	<u>10 mg</u>	<u>20 mg</u>
Omeprazol		10,00 mg	20,00 mg
Ingredientes inactivos (Manitol, Hypromellosa ftalato, Lactosa, Hypromellosa, Hidroxipropilcelulosa, Celulosa microcristalina, Alcohol cetílico, Fosfato disódico dihidrato, Laurilsulfato de sodio)		c.s.	c.s.

ACCIÓN/ES

Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA GASTROTEM?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor/acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GASTROTEM?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- Tiene dificultad o dolor al tragar la comida
- Tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones.
- Tiene diarrea prolongada o que no mejora.
- Acidez desde hace más de 3 meses.
- Acidez con mareos o transpiración.
- Dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello.

- Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez.
- Pérdida de peso inexplicable.
- Dolor de estómago, náuseas o vómitos.
- Trastornos renales y/o hepático.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.

Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos).
- Warfarina o clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes).
- Diazepam (medicamento sedante).
- Digoxina (medicamento para el corazón).
- Teofilina (medicamento broncodilatador).
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores).
- Antirretrovirales tales como nelfinavir, atazanavir (medicamentos para la infección VIH-SIDA).
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.

Tome 1 cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique las cápsulas.

No exceda la dosis de 1 cápsula diaria sin consultar a su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.

Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

No se debe tomar Omeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800-444-8694/(011)4962-6666/2247

Hospital Prof. Alejandro Posadas: (011)4654-6648/4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011)4808-2655/4801-7767

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier pregunta o duda puede comunicarse con LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A. al 0800-321-2368 o a ANMAT Responde al 0800-333-1234.

PRESENTACIONES

GASTROTEM 10 mg: 7 y 14 cápsulas. (*)

¿CÓMO DEBO CONSERVARLO?

CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C, PROTEGIDO DE LA LUZ.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O CON SU FARMACÉUTICO.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO N° 38.904.

ELABORADO EN LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., Zepita 3178 (C1285ABF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DIRECTOR TÉCNICO: PABLO STAHL, Farmacéutico.

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN:

(*) Igual prospecto para Uso Exclusivo de Hospitales en envases con: 100 cápsulas (GASTROTEM 10 mg) y 500 y 1000 cápsulas (GASTROTEM 20 mg).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2024-58503933- TEMIS LOSTALO - Prazoles prospectos - Certificado N38.904.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.